

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

Kamuschuria

Tamaño: Pequeño.

Forma: Muy diversa, piriforme, turbinada o calabaciforme. Con cuello muy variable desde casi imperceptible a largo y bien acentuado. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial, generalmente con pequeñas gibosidades.

Pedúnculo: Mediano o largo. Grosor mediano, ensanchándose en ambos extremos, a veces carnosos en la base. Recto o ligeramente curvo. Verde, parcialmente ruginoso cobrizo. Implantado generalmente derecho, a veces como prolongación del fruto.

Cavidad del ojo: Nula o casi superficial. Bordo ondulado. **Ojo:** Grande, irregular, abierto rara vez semi-cerrado. Sépalos rojizos, muy grandes, triangulares de base muy ancha, extendidos.

Piel: Lisa, fina, mate o poco brillante. **Color:** Verde alimonado pasando a amarillo pajizo. Sin chapa o con chapa poco extensa sonrosada y barreada o simplemente dorado-bronceada. Punteado abundante, muy menudo, con aureola verdosa poco perceptible. Pequeñas manchas ruginosas alrededor de la base del pedúnculo.

Tubo del cáliz: En embudo de tamaño y forma muy variable. Conducto corto, medianamente ancho. Pistilos muy largos.

Corazón: Mediano o pequeño. Redondeado o elíptico. Eje muy amplio, hueco, lanceolado. Celdillas pequeñas o medianas.

Semillas: Pequeñas, elípticas, semi-globosas, deprimidas en la cara interior. Con cuello ligero y a veces con ligero espolón. Blanquecinas.

Carne: Amarillenta. Semi-harinosa, seca, fibrosa. **Sabor:** Dulce, aromático, agradable.

Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

